

VCスティックとは

マミンCはバリア機能によって皮膚からほとんど吸収されませんが、経皮吸収型のビタミンC誘導体が開発され、皮膚に対する様々な効果が認められています

V Cスティックは経皮吸収型のビタミンC誘導体の中でも最も安定性に優れ皮膚への浸透性の高い、油溶性ビタミンC誘導体を85%と超高濃度に配合しています(市販されているVCスティックの濃度は20%ほど)

タミンCは濃度が高くなるほどメラニン抑制効果が高まります

VCスティック-効果

- ●皮脂とのなじみが良く経皮吸収性に優れ、肌の細胞自体にも取り込まれやすい(VC-IPはビタミンCそのものを塗布した時に比べ吸収率が30倍に)
- ■メラニンの増加を抑制し、コラーゲンの合成を促進
- 紫外線による細胞障害を軽減し、皮脂の酸化を防止
- 皮膚のバリア機能を高め、水分の蒸発を抑制
- ニキビ肌、ニキビ痕に効く
- 一持続的に効果が持続(塗布後24時間以上、効果を発揮し続く)
- ●安定性が高く、化粧品として保存が利き効果を失わない

VCスティック-使用方法

- 1日2回朝晩、洗顔後、化粧水の後に気になる部分に直接塗り込んでください
- 水溶性のビタミンCローションと併用する場合は水溶性のものを先に塗布し十分になじませてから上塗りしてください
- アスタキサンチン配合ジェルとの併用も可能です。VC-IPスティックにアスタキサンチン配合ジェルの色が付着するのが気になる場合は先に使用してください

VCスティック-注意点

- ・朝は必ず日焼け止めを併用してください
- ・常温で保管可能ですが、長期間使用しない場合は冷蔵庫に保管して1年間使用可能です



VC-IPスティック 5,500円(税込) クリニック限定です お気軽にご相談ください。 初回購入に限り、診察が必要です